かぜ太郎錠

第1類医薬品

かぜ薬

用法・用量

成人（15才以上）

1回3錠
×
1日3回



食後なるべく30分以内

15才未満
服用しない

効能・効果

かぜの諸症状の緩和



成分・分量　＜成人1日量（9錠）中＞

●●●●・・・・・・・・・・・・・・・・×××mg
（熱をさげ、痛みを抑えます）
●●●●●●●●●・・・・・・・・・×××mg
（抗ヒスタミン剤でを抑えます）
●●●●●・・・・・・・・・・・・・・・×××mg
（痰を切ります）
●●●●●●●●●●・・・・・・・×××mg
（せきを鎮めます）
●●●●●●●●●●●●●●・・×××mg
（気管支を広げせきを鎮めます）
●●●●●・・・・・・・・・・・・・・・×××mg
（鼻水が出るのを抑えます）
●●●●●・・・・・・・・・・・・・・・×××mg
（頭痛をしずめるのを助けます）
●●●●●●●●●●・・・・・・・×××mg
（消耗しがちなビタミンを補給します）

添加物として、＊＊＊＊＊、＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊を含有します

服用してはいけない方

このお薬で、アレルギー症状を起こしたことがある人。

このお薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬でぜんそくを起こしたことがある人。

15才未満の小児

併用してはいけない薬

このお薬をのんでいる間は、次のお薬を服用しない

他のかぜ薬
解熱鎮痛薬
鎮静薬
鎮咳去痰薬
抗ヒスタミン剤含有ののみ薬
　鼻炎用内服薬、
　乗物酔い薬
　アレルギー薬

服用にあたっての注意

服用時の飲酒は×
服用後、乗物・機械類の運転は×
5日間を超えた服用は×

授乳中の人は、服用しないか、
服用する場合は授乳を避けてください

MEMO